

Lista de Verificación transfusión sanguínea

Verificación de prescripción	Preparación	Administración	Registro
Comprobación de prescripción: <input type="checkbox"/> Nombre del/la paciente <input type="checkbox"/> Fecha de prescripción <input type="checkbox"/> Grupo Sanguíneo <input type="checkbox"/> Hemoderivado prescrito. <input type="checkbox"/> Número de unidades de transfusión <input type="checkbox"/> Firma de médico que realiza la prescripción.	<input type="checkbox"/> Lavado de manos (guantes desechables no estériles)	<input type="checkbox"/> Lavado de manos (guantes desechables no estériles)	Previo a la administración Medicamentos que está tomando el/la paciente Constantes vitales Localización y estado de catéter
	Identificar al paciente <input type="checkbox"/> Nombre y apellidos <input type="checkbox"/> Fecha de nacimiento	<input type="checkbox"/> Crear ambiente de privacidad y confianza: <input type="checkbox"/> Comprobar que se inicia transfusión antes de 30 minutos desde que sale de banco de sangre.	
	Información al paciente <input type="checkbox"/> Explicar al/la paciente el procedimiento. <input type="checkbox"/> Explicar al/la paciente motivos de la transfusión. <input type="checkbox"/> Firma de consentimiento informado	Preparar equipo de transfusión <input type="checkbox"/> Cerrar todas las llaves <input type="checkbox"/> Conectar bolsa de suero salino en una de las conexiones <input type="checkbox"/> Purgar el sistema	Después de la administración Constantes vitales Hora de inicio y fin de infusión Tipo y volumen del hemoderivado Identificación de la Unidad de Sangre Compatibilidad Fecha de caducidad
	Comprobación de vía <input type="checkbox"/> Permeabilidad de vía <input type="checkbox"/> No existencia de flebitis o infiltración	Preparar hemoderivado <input type="checkbox"/> Agitar suavemente. <input type="checkbox"/> Conectar la unidad con una conexión en Y. <input type="checkbox"/> Cerrar llave de suero salino. <input type="checkbox"/> Abrir llave por encima del filtro hacia unidad de sangre. <input type="checkbox"/> Purgar el sistema con sangre.	
	Calibre de la vía: <input type="checkbox"/> Adultos: catéter periférico corto a partir de 18G <input type="checkbox"/> Infantil: catéter 22-24G		
	Constantes vitales previas: <input type="checkbox"/> Temperatura <input type="checkbox"/> Pulso y Presión Arterial <input type="checkbox"/> Respiraciones <input type="checkbox"/> Vaciar bolsa de diuresis o pedir que miccione.	Administración <input type="checkbox"/> Conectar sistema al paciente. <input type="checkbox"/> Regular infusión 2ml/min (20 gotas/min) los 15 primeros minutos. <input type="checkbox"/> Permanecer junto a paciente los 15 primeros minutos. <input type="checkbox"/> Si no se produce reacción transfusional regular ritmo según prescripción.	

Redes sobre la articulación de las TIC en la Enseñanza Superior: TIC-TAC EN EL ENTORNO DE APRENDIZAJE PRÁCTICO

Verificación de prescripción	Preparación	Administración	Registro
	<p><input type="checkbox"/> Obtención de Hemoderivado</p> <p>Comprobación de hemoderivado: dos verificadores</p> <p><input type="checkbox"/> Identificar paciente: Nombre y apellidos, Grupo sanguíneo, Rh y</p> <p><input type="checkbox"/> Hemoderivado es correcto.</p> <p><input type="checkbox"/> Número de pulsera identificativa y el de la unidad de sangre coinciden.</p> <p><input type="checkbox"/> Número de unidad en la bolsa de sangre y número de unidad en formulario coinciden.</p> <p><input type="checkbox"/> Grupo sanguíneo de unidad y de paciente coinciden.</p> <p><input type="checkbox"/> Comprobar que la bolsa o el contenido no estén dañados.</p> <p><input type="checkbox"/> Fecha de caducidad</p>	<p>Monitorización</p> <p><input type="checkbox"/> 5 minutos</p> <p><input type="checkbox"/> 15 minutos</p> <p><input type="checkbox"/> 30 minutos.</p> <p><input type="checkbox"/> Cada 30 min hasta fin de trasfusión.</p> <p><input type="checkbox"/> 1 hora después de transfusión.</p> <p><input type="checkbox"/> Comprobar zona de perfusión y estado de la transfusión cada vez que se tomen constantes vitales</p> <hr/> <p>Observar:</p> <p><input type="checkbox"/> Aparición de signos adversos: Escalofríos, dolor de espalda, cefalea, náuseas, vómitos, taquicardia, taquipnea, disnea, exantema, prurito o hipotensión.</p> <p><input type="checkbox"/> Otros signos de reacción transfusional</p> <hr/> <p>Ante una reacción transfusional:</p> <p><input type="checkbox"/> Detener transfusión.</p> <p><input type="checkbox"/> Avisar a facultativo/a</p> <p><input type="checkbox"/> Controlar constantes</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Limpiar vía con suero fisiológico</p> <p><input type="checkbox"/> Guardar bolsa transfusional para análisis en laboratorio.</p> <p><input type="checkbox"/> Desechar equipo según normativa</p>	